


THEME 9 :

FONCTIONS (2) : FONCTIONS AFFINES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES




ACTIVITE 1 : " LES GAUFRES " (Suite du thème 3)

A l'occasion de la fête du village, Julien et Nathalie ont décidé de faire des gaufres et de les vendre 2 € pièce.

A) LES RECETTES (Rappels du thème 3)

Représentation graphique de la fonction $f: x \mapsto 2x$.



La représentation graphique d'une fonction linéaire est une **droite qui passant par l'origine du repère** de coordonnées (0 ; 0)

Il faut donc calculer les coordonnées d'un deuxième point :

$$\text{On a : } f(40) = 2 \times 40 = 80$$

x	0	40
$f(x)$	0	80

Point de coordonnées (0 ; 0)

Point de coordonnées (40 ; 80)

B) LES DEPENSES

1°) a. Julien et Nathalie ont dû payer **une taxe de 20 €** et de plus ils ont calculé que **le prix de revient d'une gaufre était de 1,50 €**. On appelle p le montant total des frais.

Complète le tableau :

x	0	10	20	30	40	50	100	140
p	20	35	50	65	80	95	170	230

Ici le **mécanisme peut s'écrire** $x \mapsto 1,5x + 20$.


Le processus est « je multiplie par 1,5 puis j'ajoute 20 »

Est-ce un tableau de proportionnalité ? **Non, car il n'existe pas de coefficient de proportionnalité**

b. Représente sur une feuille de papier millimétré ce tableau de valeurs (même échelle que A-2°). Relie les points.

Quelles sont tes remarques à propos de ce graphique ? :

Les points sont alignés sur une demi-droite ayant comme origine le point de coordonnées (0 ; 20)



2°) On suppose maintenant que le **prix de la taxe s'élève à 50 €** le prix d'une gaufre restant inchangé.

Notons p_1 le montant total des frais. On a : $p_1 : x \mapsto 1,5x + 50$ ou encore $p_1(x) = 1,5x + 50$

Complète le tableau suivant :

x	0	10	20	30	50	80	100
p_1	50	65	80	95	125	170	200

Représente sur le même graphique la fonction p_1 d'équation $y = 1,5x + 50$.

Comment évolue le graphique ?:

La demi-droite a pour origine le point de coordonnées (0 ; 50) et elle est parallèle à la droite d'équation $y = 1,5x + 20$.

3°) On suppose maintenant que le **prix d'une gaufre est de 0,50 €** la taxe étant de 20 €

Notons p_2 le montant total des frais. On a : $p_2 : x \mapsto 0,5x + 20$ ou encore $p_2(x) = 0,5x + 20$

Complète le tableau suivant :


x	0	10	20	30	50	80	100	140
p_2	20	25	30	35	45	60	70	90

Représente sur le même graphique la fonction p_1 d'équation $y = 0,5x + 20$.

Comment évolue le graphique ?:

La demi-droite à la même origine que la demi-droite d'équation $y = 1,5x + 20$ mais la pente n'est pas la même.

4°) **Bénéfice**



Sur un troisième graphique, représente la fonction f (situation A) et la fonction p (situation B-1)

Graphiquement, A partir de quel moment ils commencent à faire des bénéfices ?

Les deux demi-droites se coupent au point de coordonnées (40 ; 80) . il faut donc vendre au moins 40 gaufres pour commencer à faire des bénéfices.

Exercice n°1 :

Fonction	a	b
$x \mapsto -2x$	-2	0
$x \mapsto 5x$	5	0
$x \mapsto 2x - 1$	2	-1
$x \mapsto x + 2$	1	2
$x \mapsto \frac{1}{3}x - 4$	$\frac{1}{3}$	-4

Indique le coefficient a et l'ordonnée à l'origine b pour les fonctions affines suivantes :

Exercice n°2 : On considère les cinq fonctions suivantes :

$$f: x \mapsto 5x; \quad g: x \mapsto x + 4; \quad h: x \mapsto \frac{3}{x}; \quad i: x \mapsto \frac{x}{4} - 3; \quad j: x \mapsto -3x + 7.$$

Complète les pointillés par une valeur numérique ou avec l'un des mots suivants : « fonction » ; « linéaire » ; « affine » ; « coefficient » ; « ordonnée » ; « origine » ; « multiplie » ; « ajoute » .

- f est une fonction **linéaire** de **coefficient 5** : elle **multiplie** la variable x par 5.
 f est aussi une fonction **affine** de **coefficient 5** et d'**ordonnée** à l'**origine 0**.
- g est une **fonction affine** de coefficient **1** et d'**ordonnée** à l'**origine 4** :
elle **multiplie** la variable x par **1** puis **ajoute 4**.
- i est une **fonction affine** de **coefficient $\frac{1}{4}$** et d'**ordonnée** à l'**origine - 3** :
elle **multiplie** la variable x par $\frac{1}{4}$ puis **ajoute - 3**.
- h n'est pas une **fonction affine** car elle divise 3 par x au lieu de **multiplier** x par un coefficient.
- j est une **fonction affine** de **coefficient - 3** et d'**ordonnée** à l'**origine +7** :
elle **multiplie** la variable x par **- 3** puis **ajoute + 7**

Exercice n°3 :

On donne cinq programmes de calcul : écris-les sous la forme $x \mapsto \dots$, et dis s'il s'agit d'une fonction affine (en indiquant son coefficient et son ordonnée à l'origine) :

a) Pour trouver l'image d'un nombre, on le multiplie par 7 et on ajoute - 6.

$$x \mapsto 7x - 6; \text{ fonction affine : coefficient } 7 \text{ et ordonnée à l'origine } - 6;$$

b) Pour trouver l'image d'un nombre, on le multiplie par - 6 et on ajoute 7.

$$x \mapsto -6x + 7; \text{ fonction affine : coefficient } - 6 \text{ et ordonnée à l'origine } + 7;$$

c) Pour trouver l'image d'un nombre, on le multiplie par lui-même et on ajoute 1.

$$x \mapsto x^2 + 1 \text{ (fonction carrée)}$$

d) Pour trouver l'image d'un nombre, on le multiplie par 2,8.

$$x \mapsto 2,8x; \text{ fonction linéaire : coefficient } 2,8;$$

e) Pour trouver l'image d'un nombre, on le multiplie par 5 et on soustrait 6,3.

$$x \mapsto 5x - 6,3; \text{ fonction affine : coefficient } 5 \text{ et ordonnée à l'origine } - 6,3;$$

Exercice n°4 : Observe les quatre fonctions suivantes :

$$f: x \mapsto x + 5; \quad g: x \mapsto x - 5; \quad h: x \mapsto 5x; \quad i: x \mapsto \frac{x}{5}.$$

a) A laquelle de ces fonctions correspond le processus « je multiplie par 5 » ?

Le processus « je multiplie par 5 » correspond à la fonction h

b) Décris le processus correspondant à chacune des autres fonctions.

Pour la fonction f : « je multiplie par 1 puis j'ajoute 5 »

Pour la fonction g : « je multiplie par 1 puis j'ajoute -5 »

Pour la fonction i : « je multiplie par $\frac{1}{5}$ »

c) Parmi les quatre fonctions, indique celles qui sont linéaires et celles qui sont affines.

Les fonctions affines sont les fonctions f ; g ; h ; i

Les fonctions linéaires sont les fonction h et i .

Exercice n°5 : Soit g la fonction affine définie par $g : x \mapsto 5x - 8$.

a) Calcule l'image de 7 par la fonction g .

$$g(x) = 5x - 8$$

$$g(7) = 5 \times 7 - 8$$

$$g(7) = 27$$

L'image de 7 par la fonction affine g est 27.

b) Calcule le nombre ayant pour image 12 par la fonction g .

$$g(x) = 5x - 8$$

$$12 = 5x - 8$$

$$12 + 8 = 5x$$

$$\frac{20}{5} = x$$

$$4 = x$$

Le nombre ayant pour image 12 par la fonction affine g est 4.

Exercice n°6 : Soit f_1 et f_2 deux fonctions telles que $f_1(x) = 5x$ et $f_2(x) = -3x + 2$.

a) Calcule $f_1(2)$ et $f_2(-5)$.

$$f_1(x) = 5x$$

$$f_1(2) = 5 \times 2$$

$$f_1(2) = 10$$

$$f_2(x) = -3x + 2.$$

$$f_2(-5) = -3 \times (-5) + 2.$$

$$f_2(-5) = 17.$$

L'image de 2 par la fonction linéaire f_1 est 10

L'image de (-5) par la fonction affine f_2 est 17

b) Calcule le nombre ayant pour image 18 par f_1 .

$$f_1(x) = 5x$$

$$18 = 5x$$

$$\frac{18}{5} = x$$

$$3,6 = x$$

Le nombre ayant pour image 18 par la fonction linéaire f_1 est 3,6.

c) Calcule le nombre qui a pour image 8 par la fonction f_2 .

$$f_2(x) = -3x + 2.$$

$$8 = -3x + 2$$

$$8 - 2 = -3x$$

$$6 = -3x$$

$$-\frac{6}{3} = x$$

$$-2 = x$$

Le nombre ayant pour image 8 par la fonction affine f_2 est - 2.

Exercice n°7 : a) Calcule les images de : - 1,5 ; 2 ; 0 ; $\frac{2}{3}$ et $-\frac{1}{2}$ par la fonction affine $g : x \mapsto -2x + 4$.

$$g(x) = -2x + 4$$

$$g(-1,5) = -2 \times (-1,5) + 4$$

$$g(-1,5) = 7$$

L'image de - 1,5 par la fonction affine g est 7.

$$g(x) = -2x + 4$$

$$g(0) = -2 \times 0 + 4$$

$$g(0) = 4$$

L'image de 0 par la fonction affine g est 4

$$g(x) = -2x + 4$$

$$g\left(-\frac{1}{2}\right) = -2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) + 4$$

$$g\left(-\frac{1}{2}\right) = 5$$

L'image de $-\frac{1}{2}$ par la fonction affine g est 5

$$g(x) = -2x + 4$$

$$g(2) = -2 \times 2 + 4$$

$$g(2) = 0$$

L'image de 2 par la fonction affine g est 0

$$g(x) = -2x + 4$$

$$g\left(\frac{2}{3}\right) = -2 \times \frac{2}{3} + 4$$

$$g\left(\frac{2}{3}\right) = -\frac{4}{3} + \frac{12}{3}$$

$$g\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{8}{3}$$

L'image de $\frac{2}{3}$ par la fonction affine g est $\frac{8}{3}$

b) Calcule le nombre ayant pour image 7 par la fonction g .

$$g(x) = -2x + 4$$

$$7 = -2x + 4$$

$$7 - 4 = -2x$$

$$-\frac{3}{2} = x$$

$$4 = x$$

Le nombre ayant pour image 7 par la fonction affine g est $-\frac{3}{2}$.

Exercice n° 8 : Soit h la fonction affine telle que $h(x) = \frac{x}{3} + 2$.

a) Détermine les nombres $h(-2)$; $h\left(\frac{1}{5}\right)$; $h(0)$ et $h\left(\frac{3}{4}\right)$.

$$h(x) = \frac{x}{3} + 2.$$

$$h(-2) = \frac{-2}{3} + 2$$

$$h(-2) = \frac{-2}{3} + \frac{6}{3}$$

$$h(-2) = \frac{4}{3}$$

L'image de -2 par la fonction affine h est $\frac{4}{3}$

$$h(0) = \frac{x}{3} + 2.$$

$$h(0) = \frac{0}{3} + 2$$

$$h(0) = 2$$

L'image de 0 par la fonction affine h est 2

$$h(x) = \frac{x}{3} + 2.$$

$$h\left(\frac{1}{5}\right) = \frac{\frac{1}{5}}{3} + 2$$

$$h\left(\frac{1}{5}\right) = \frac{1}{5} : 3 + 2$$

$$h\left(\frac{1}{5}\right) = \frac{1}{5} \times \frac{1}{3} + \frac{30}{15}$$

$$h\left(\frac{1}{5}\right) = \frac{31}{15}$$

L'image de $\frac{1}{5}$ par la fonction affine h est $\frac{31}{15}$

$$h(x) = \frac{x}{3} + 2.$$

$$h\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{\frac{3}{4}}{3} + 2$$

$$h\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{4} : 3 + 2$$

$$h\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} + \frac{24}{12}$$

$$h\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{27}{12} = \frac{9}{4}$$

L'image de $\frac{3}{4}$ par la fonction affine h est $\frac{9}{4}$

b) Détermine le nombre ayant pour image -3 par la fonction h .

$$h(x) = \frac{x}{3} + 2$$

$$-3 = \frac{x}{3} + 2$$

$$-3 - 2 = \frac{x}{3}$$

$$-5 = \frac{x}{3}$$

$$-5 \times 3 = x$$

$$-15 = x$$

Le nombre ayant pour image -3 par la fonction h est -15

Exercice n° 9 : Complète le tableau suivant, sachant que f est la fonction linéaire définie par $f(x) = -5x$ et g la fonction affine définie par $g(x) = 4x - 5$.

x	-3	-1	0	2	5	8
-----	------	------	-----	-----	-----	-----

$f(x)$	15	5	0	-10	-25	-40
$g(x)$	-17	-9	-5	3	15	17

Exercice n°10 : Soit f_1 et f_2 deux fonctions tel-les que $f_1(x) = 2x$ et $f_2(x) = -3x + 4$.


1°) Soit d_1 la représentation graphique de f_1 et d_2 la représentation graphique de f_2 .

Complète les deux tableaux :

x	0	2
$f_1(x)$	0	4

x	0	1
$f_2(x)$	4	1

2°) Reproduis et termine le graphique :



Exercice n°11 : Recopie et complète avec le mot « images » ou avec l'expression « nombres de départ » :

a) On représente les **nombres de départ** sur l'axes des abscisses.

b) On représente les **images** sur l'axes des ordonnées.


Exercice n°12 : Représente dans ce repère ces fonctions affines :

x	0	1
$f(x)$	1	3


x	0	2
$g(x)$	2	4

x	0	-2
$h(x)$	1	-2

x	0	-2
$k(x)$	$\frac{1}{2}$	1



Exercice n°13: Représente les fonctions f et g telles que : $f(1) = 2$; $f(-3) = -1$; $g(-4) = 0$; $g(2) = -$



Exercice n°14 : 1°) Sur un même repère, trace les représentations graphiques des fonctions suivantes :

$$f(x) = -x - 3 ;$$


$$g(x) = 2x + 5 ;$$

$$h(x) = -3x + 2.$$

x	0	-5
$f(x)$	-3	2

x	0	-2
$g(x)$	5	1

x	0	2
$h(x)$	2	-4




2°) Mêmes consignes avec : a) $f(x) = 3x - 2$; $g(x) = 3x + 1$; $h(x) = 3x$.

x	0	2
$f(x)$	-2	4

x	0	-2
$g(x)$	1	-5

x	0	1
$h(x)$	0	3




- b) Que peut-on constater ? Les trois droites sont parallèles.
 Pourquoi ? Les fonction ont toutes le même coefficient directeur


Exercice n°15 : 1°) Trace la droite d de coefficient directeur 3 et qui passe par le point $A(-1 ; 2)$.
 2°) Lis sur le graphique l'ordonnée à l'origine de d .
 3°) d représente graphiquement la fonction affine f .
 Détermine la fonction f en utilisant le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine.

Exercice n°16 : Je te donne des fonctions affines, tu dois dessiner l'allure de la représentation graphique.
Aide: est-ce une droite montante, descendante, horizontale, passant par, au-dessus, au-dessous de l'origine ?


$$x \mapsto -3x$$




$$x \mapsto -3x - 5$$




$$x \mapsto -3x + 3$$




$$x \mapsto -3$$



$$x \mapsto 7x + 2$$



$$x \mapsto 7x - 5$$



Exercice n°17 : Le club de tennis d'une ville propose 3 tarifs à ses adhérents:

Tarif A : 8 € de l'heure

Tarif B : une cotisation de 150 € et 5 € de l'heure

Tarif C : Une carte annuelle de 500 € permettant de jouer autant d'heures voulues.

On note x le nombre d'heures et $p(x)$ le prix à payer pour l'année.

1°) Tarif A:

x	0	5	10	25	40	50	60	70
$p_A(x)$	0	40	80	200	320	400	480	560

Exprime $p_A(x)$ en fonction de x : $p_A(x) = 8x$

Soit (D₁) la droite représentative de la fonction p_A

2°) Tarif B:

x	0	5	10	25	40	50	60	70
$p_B(x)$	150	175	200	275	350	400	450	500

Exprime $p_B(x)$ en fonction de x : $p_B(x) = 5x + 150$

Soit (D₂) la droite représentative de la fonction p_B

3°) Tarif C:

x	0	2	5	10	25	40	50	60	70
$p_C(x)$	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Exprime $p_C(x)$ en fonction de x : $p_C(x) = 500$

Soit (D₃) la droite représentative de la fonction p_C

4°) Tarif le plus avantageux par lecture graphique

Soit A (50 ; 400) le point d'intersection des droites (D₁) et (D₂).

Soit B (70 ; 500) le point d'intersection des droites (D₂) et (D₃).


Pour $0 < x < 50$, la droite (D₁) est sous les droites (D₂) et (D₃). Le tarif A est le plus avantageux pour un nombre d'heures inférieur à 50.

Pour $x = 50$, les droites (D₁) et (D₂) se coupent en A (50 ; 400). Pour seulement 50 heures, on a le choix entre le tarif A et le tarif B.

Pour $50 < x < 70$, la droite (D₂) est sous les droites (D₁) et (D₃). Le tarif B est le plus avantageux pour un nombre d'heures compris entre 50 et 70.

Pour $x = 70$, les droites (D₃) et (D₂) se coupent au point B (70 ; 500). Pour 70 heures, on a le choix entre le tarif B ou le tarif C.

Pour $x > 70$, la droite (D₃) est sous les droites (D₁) et (D₂). Le tarif C est le plus avantageux pour un nombre d'heures supérieures à 70 heures.



ACTIVITE 2 : « Proportionnalité des accroissements »

Soit f la fonction affine définie par $f(x) = 2x + 1$.

1. Complète le tableau :

x	- 2	- 1	3	5	10
$f(x)$	-3	-1	7	11	21

2. En utilisant les valeurs du tableau, calcule :

$$\frac{f(10) - f(5)}{10 - 5} = \frac{21 - 11}{10 - 5} = \frac{10}{5} = \mathbf{2}$$

$$\frac{f(5) - f(-1)}{5 - (-1)} = \frac{11 - (-1)}{5 - (-1)} = \frac{12}{6} = \mathbf{2}$$

$$\frac{f(-1) - f(-2)}{(-1) - (-2)} = \frac{-1 - (-3)}{(-1) - (-2)} = \frac{2}{1} = \mathbf{2}$$

3. Prévoir la valeur du quotient $\frac{f(10) - f(3)}{10 - 3} = \mathbf{2}$

Vérifie par le calcul : $\frac{f(10) - f(3)}{10 - 3} = \frac{21 - 7}{10 - 3} = \frac{14}{7} = \mathbf{2}$

4. Généralisation

On donne deux nombres relatifs distincts a et b .


Exprime $f(a)$ en fonction de a : $f(a) = \mathbf{2a + 1}$

Exprime $f(b)$ en fonction de b : $f(b) = \mathbf{2b + 1}$

Calcule : $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{2b + 1 - (2a + 1)}{b - a} = \frac{2b + 1 - 2a - 1}{b - a} = \frac{2b - 2a}{b - a} = \frac{2(b - a)}{b - a} = \mathbf{2}$

Exercice n°18 : On note $x \mapsto ax + b$ la fonction affine représentée par la droite d .


Lire sur le graphique l'ordonnée à l'origine, déterminer le coefficient directeur puis la fonction affine.



Ordonnée à l'origine est : 3

Le coefficient directeur est : $\frac{2}{3}$


La fonction est : $x \mapsto \frac{2}{3}x + 3$



Ordonnée à l'origine est : 0

Le coefficient directeur est : $\frac{1}{5}$


La fonction est : $x \mapsto \frac{1}{5}x$



Ordonnée à l'origine est : 2

Le coefficient directeur est : 0


La fonction est : $x \mapsto 2$



Ordonnée à l'origine est : 0

Le coefficient directeur est : $-\frac{3}{2}$


La fonction est : $x \mapsto -\frac{3}{2}x$



Ordonnée à l'origine est : 2

Le coefficient directeur est : $\frac{1}{2}$

La fonction est : $x \mapsto \frac{1}{2}x + 2$



Ordonnée à l'origine est : -3

Le coefficient directeur est : $-\frac{2}{3}$

La fonction est : $x \mapsto -\frac{2}{3}x - 3$

Exercice n°19 :

Voici une liste de 5 fonctions définies par leur image :

$$f(x) = 2x - 3 \quad g(x) = -2 \quad j(x) = -3x + 2 \quad h(x) = \frac{1}{3}x + 2 \quad k(x) = 2x$$

Retrouver les fonctions représentées par les droites ci-contre, préciser la *nature* et le *sens de variation* :


D_1 représente la fonction : j
elle est **affine** et **décroissante**

D_2 représente la fonction : k
elle est **linéaire** et **croissante**

D_3 représente la fonction : f
elle est **affine** et **croissante**

D_4 représente la fonction : h
elle est **affine** et **croissante**

D_5 représente la fonction : g .
elle est **constante**



Exercice n°20 :

Madame Martin veut inscrire sa fille au club de vacances pour des activités sportives et culturelles au mois d'août prochain. Elle doit choisir entre les deux formules :

- *Formule J* : chaque journée-vacances coûte 10 €
- *Formule C* : une cotisation annuelle de 16 € au club vacances et 8 € par jour.

1. Tableau

Nombre de jours	5	10	15
Dépense <i>Formule J</i>	50	100	150
Dépense <i>Formule C</i>	56	96	136

2. Si x désigne le nombre de jours,

- pour la *formule J* : $f(x) = 10x$ f est **linéaire**
- pour la *formule C* : $g(x) = 8x + 16$ g est **affine**

3. Représentation graphique

- $f(x) = 10x$

f est une **fonction linéaire** de la forme $f(x) = ax$ avec $a = 10$

Sa représentation graphique est donc une droite d qui passe par l'origine du repère et le point de coordonnées $(5 ; 50)$. En effet $f(5) = 10 \times 5 = 50$.

x	0	5
$f(x)$	0	50

- $g(x) = 8x + 16$

g est une **fonction affine** de la forme $g(x) = ax + b$ avec $a = 8$ et $b = 16$

Sa représentation graphique est donc une droite d' qui passe par les points de coordonnées $(0 ; 16)$ et $(10 ; 96)$.

En effet $g(0) = 8 \times 0 + 16 = 16$ et $g(10) = 10 \times 8 + 16 = 96$

x	0	10
$g(x)$	16	96

a) **Lecture graphique du nombre de jours pour lequel les deux dépenses seront les mêmes.**

Les deux formules sont égales lorsque les **deux droites se coupent.**

Le point d'intersection des droites d et d' a pour coordonnées $(8 ; 80)$

Le nombre de jours est 8

b) **Vérification par le calcul.**

Si le prix à payer est le même, alors on a l'égalité :

$$10x = 8x + 16$$

$$10x - 8x = 16$$

$$2x = 16$$

$$x = 16 : 2$$

$$\boxed{x = 8}$$

Donc pour 8 jours, le prix à payer est le même pour les deux formules

c) **Lecture graphique pour permettant d'indiquer la formule la plus économique pour 12 jours.**

Pour 12 jours, la droite d' est en dessous de la droite d . **La formule C est donc la plus économique .**

En effet, avec la formule C, 12 jours coûtent 112 € alors que pour la formule J, les 12 jours coûtent 120 €.

